

Clareva Gel™

GEL COUVRANT ET PROTECTEUR

Traitement symptomatique de l'herpès génital

INDICATIONS


Clareva Gel est un gel recouvrant et protecteur pour le traitement symptomatique de l'herpès génital. Il contient des triglycérides oxydés provenant d'acides gras essentiels végétaux. Clareva Gel recouvre les lésions herpétiques d'un film protecteur invisible. Il protège et facilite par conséquent le processus de guérison.

Dès le premier jour de traitement, Clareva Gel a un effet positif sur les signes et les symptômes douloureux de l'herpès. L'efficacité de Clareva Gel a été démontrée dans le cadre d'une étude clinique comparative*.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Appliquer Clareva Gel cinq fois par jour jusqu'à la guérison ou pendant 12 jours au maximum avec le doigt ou un coton-tige de façon à recouvrir les lésions avec un léger débordement. Veiller à ce que les mains soient nettoyées avant et après l'application afin d'empêcher toute transmission du virus herpétique à d'autres zones de la peau.



CLAREVA GEL (RÉSULTATS PROUVÉS CLINIQUEMENT*) :

- ▶ Réduit significativement dès le premier jour d'application les symptômes douloureux de l'herpès génital.
- ▶ Réduit les autres symptômes subjectifs de l'herpès génital dès le premier jour d'application (prurit, picotements, brûlures).
- ▶ Protège et facilite par conséquent le processus de guérison.



MISES EN GARDE

Clareva Gel est destiné à l'usage externe et ne doit pas être utilisé dans la région des yeux.

L'innocuité et la bonne tolérance de ce produit ont été prouvées.

Clareva Gel ne doit pas être utilisé en cas de lésion surinfectée ainsi que chez les personnes présentant une hypersensibilité à l'un des composants. En cas de réaction allergique, il est recommandé d'interrompre le traitement et de consulter un médecin.



Si une amélioration des symptômes ne se manifeste pas au bout de 12 jours de traitement, il faut consulter un médecin.

Réservé à l'adulte. Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Clareva Gel doit être conservé à température ambiante et hors de portée des enfants. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption figurant sur le pli du tube et sur l'étui.

Tout tube entamé doit être détruit à la fin de la crise d'herpès

COMPOSITION DE CLAREVA GEL

Triglycérides oxydés (TGO) provenant d'acides gras essentiels végétaux.

Excipients: dioxyde de silicium, oxyde de zinc.

PRÉSENTATION

Clareva Gel : tube de 10g.

*Étude clinique : Évaluation de l'activité et de la tolérance du produit Clareva Gel, gel couvrant et protecteur, sur les signes fonctionnels de l'herpès génital. Étude comparative randomisée multicentrique menée en investigateur simple aveugle, sur des patients ayant des antécédents d'herpès génital récurrent.

QU'EST-CE QUE L'HERPÈS GÉNITAL?

L'herpès génital est une maladie sexuellement transmissible fréquente généralement due à Herpes Simplex Virus de type 2 (HSV2) mais HSV1 (impliqué dans l'herpès labial) peut également être en cause. La lésion herpétique est douloureuse et contagieuse pendant deux semaines.

Les premiers signes de la crise d'herpès génital sont : démangeaisons et brûlures fugaces à l'endroit de la lésion. Ensuite, on observe des petites vésicules groupées en bouquets sur les régions atteintes après quoi apparaissent des croûtes qui annoncent la fin de la poussée.

QU'EST-CE QUI ENTRAÎNE UNE POUSSÉE D'HERPÈS?

Après la première crise d'herpès génital, le virus reste dans le corps et certains patients présenteront des récurrences lors de facteurs déclenchants : stress, menstruations, grippe, corticothérapie.

DISPOSITIF MÉDICAL

CE 1014

Fabricant : Laboratoires Carilene



7, rue du Chant des Oiseaux
F - 78360 Montesson

Année du marquage CE : 2013

Date de dernière révision : 18 février 2014

Distributeur : HRA Pharma

14/16 rue des Petits Hôtels
F- 75010 Paris



: Consulter le mode d'emploi



: Dispositif Médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE et 2007/47/CE



: Utiliser jusqu'au



: Numéro de lot